

العناية بالأطفال في المراحل الأولى من العمر مع تطبيق بعض الحالات التي تتطلب العناية
معها خاصة من قبل الوالدين ووجه تدخل الطبيب .

* الاهتمام بعين الطفل منذ اللحظة الأولى للولادة يعني الاهتمام بعين الطفل
حيث إنه عينيته قد تتأثر ببعض الإفرازات أثناء الولادة
وقد يكتسب عدوى عينية في أي مرحلة من مراحل العمر
وتظهر الأعراض عليه كالآتي (قد تظهر بعينها وقد تظهر كلاهما)

١- احمرار العينين .
٢- إفرازات شحافة كالدموع ثم تتحول الإفرازات صديدية بيضاء أو صفراء .
٣- وقد يلاحظ والدانه أنه الطفل يفرغ في عينيه باستمرار .

٤- وقد يسير مع وجود مثل العدوى البسيط على عينيته التي تقوم بصحة
وعليه يلاحظ الطفل قطرة للمياه ٦ ساعات لمدة ٥ أيام موضع العينين
والمرضى خاصة جداً في معظم الأحيان لوقاية من أي أمراض قد تصاب بها أثناء الولادة

e.g. Tobrin eye drops
or - Iso nephenicol eye drops
or - Isoptofenicol eye drops

وفي بعض الأحيان قد تستدعي عدوى العينين الإسراع بوضع قطرة (٦-٨ مرات يومياً)
مع مضادات حيوية مستحضرات والمراهم الخاصة مثل

عينيل للعينين ٤-٨ مرات يومياً → e.g. Boric acid lotion &/
+ Garamycin or gentamycin eye ointment

مرهم للعينين مرة قبل النوم
مع الاهتمام بعين الطفل في تخفيف بعض الحفوف أو عينيته حتى لا يتأثر العينين
لأنه إذا تأخرت في الأمومة باستعمال نفس القطرة كما ذكرنا لا يتم فصل العدوى من الطفل
نفسه بالاستعمال المتكرر لنفس القطرة . ولكن ينبغي تخفيف كمية العينين
بواسطة مناديل ورقيقة معقمة تستعمل مرة واحدة ثم يتم تنظيف أو التخلص منها
مع العناية على الطفل بعدم فرك عينيته باستعمال يديه أو الأشياء التي يمكن أن تلامسها
فيجب العلم أنه في أغلب الأحيان فإنه نظافة الطفل الشخصية ونظافة عينيته
قد تنجحانه في التغلب على عدوى عينيته حتى يبرأ استعمال الدواء
بينما قد يفشل الدواء حتى مع استعماله بصورة مكثفة في القضاء على العدوى
إذا لم يتم الاهتمام بنظافة عيني الطفل .

* الاسم سرية الطفل

في إبداء الطبيعة لمعظم الأطفال الذين يولدون مكتملين الغر فانه الجزء المتبقى من الحمل السري يسقط في خلال سبعة أيام تقريباً .
وبعد الجزء المتبقى من الحمل السري في الطفل بمراحل حتى يتم سقوطه وذلك كالآتي

- ١- يكونه عند الولادة أيامه اللون
- ٢- ثم يحمر الجزء المحيط بسرة الطفل اعمراً ببطا ويصاحبه ذلك تغير في لونه الحمل السري حتى يتحول للون الاسود
- ٣- وعند اليوم السابع تقريباً يسقط الجزء المتبقى من الحمل السري
- * المضغ التي يتم توصيلها للوالدين حتى تترك هذه الخطوات طبيعياً :
- ١- يتم التقشير على سرة الطفل بالكحول (البرق) وقطعة قطنية او قماش مده
- موقعه ٢-٤ واثني يومياً وتترك هذه العملية حتى ٢-٤ أيام بعد سقوط
- الحمل السري

- ٢- تجنب التغير الزائد عند اللزوم لأنه لا يمكن تغيير عملية انفصال الحمل السري أو يترك من التقراب الحدد للطفل مما يزيد من ألم الطفل
- ٣- تجنب دوط الملابس أو الحفاضات بسرة عذر اسرة الطفل حيث انها تكون ملتهبة طبيعياً وهذا قد يضر الطفل بالألم
- ٤- عليه وضع قطعة من الحفاض او قطعة منقعة على سرة الطفل قبل تغيير الحفاضات والبالاسه تجنباً للتقارب لها واستمر مع سرة الطفل
- * متى تغيره ليعالذانه للطبيب :

- ١- عند تاخر انفصال الحمل السري عن الجسم طبيعياً
- ٢- عند وجود بعض الإفرازات التي تخرج من الحمل السري مثل الدم او الصديد أو البول أو البراز
- ٣- عند الانتفاخ الزائد للحمل السري وظهور منطقة للطفل أو تشوهات

* العناية بمخففات الطفل (التطبيقات المخففات)

للعناية بمخففات الطفل وتجنب التهابات المخففات تسمى الاسم بالآتي
 ١. لتغيير اسم المخففات الطفل: وتسمى التطبيقات المخففات متغيرة ولا تسمى للبول أو البز
 لحذر الطفل فترة طويلة ومضيق في فصل الصيف والذي قد يغيره لغيره لعدم وزن وسين
 التطبيقات أيضاً.

٢. بوضع بعض المستحضرات التي تسمى الطفل ومن هذه التطبيقات والتي تحتوي على بعض
 المواد مثل أكسيد الزنك "Zinc oxide" أو الفازلين "Vaseline".
 ويتم وضع هذه المستحضرات مع كل عملية تغيير للمخففات.

- * ٨ Zinc oxide ointment 10/
- or Zinc olive lotion or Zincolive lotion
- or No Rash cream or A1 cream
- or Baby cream or Zincosil cream
- or Vaseline boric acid ointment

← عند حدوث التهابات بهذه التطبيقات فإنه يجب أن يلبس الأسماء بكيفية فقط الاستمرار في وضع المستحضرات
 السابقة وسوف تنتهي التطبيقات في (بضع أيام).

وعند استعمال التطبيقات تسمى فإنها ينبغي استشارة الطبيب لوضع الدواء بعناية
 وساعتها قد يسمى استخدام بعض المستحضرات التي تحتوي على الكورتيزون:

- * ٩ Dermatotop or Periderm cream → مرتين يومياً

أو وضع المستحضرات التي تحتوي على الكورتيزون مع مضادات الفطريات:

- * ١٠ Kenakomb, Sicorten plus, Dakatort, Micosone, Pevision,
 Triderm, Polyderm, Lotriderm or Quadriderm cream.

مع تجنب استعمال التطبيقات العادية الذي قد يزيد من التهابات أو يؤلم الطفل.

وفي هذه الأسماء قد يسمى أنه يتوقف الاسم عند الباص للطفل المخففات

على فترات من الدواء لتغيره بشدة لكمية أكبر من الدواء وتجنبه للاستهلاك

للبول والبراز فترة طويلة حتى يتم القضاء على هذه التطبيقات